

تحليل علاقة التغير بقيم الإشعاع الشمسي في العراق
أ.م.د. علي مهدي الدجيلي
جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

المستخلص:-

البحث هو جهد علمي جغرافي مناخي ، يهدف الى تحليل العلاقة بين التغير والإشعاع الشمسي الواصلة لسطح الأرض في منطقة الدراسة اجري البحث في خمس محطات مناخية تابعة للهيئة العامة للأقواء الجوية العراقية هي (الموصل، كركوك، بغداد، الرطبة، الناصرية) و للمدة (1970-2007) ، استخدم برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) الإصدار (15) ، ومن خلاله استعمل معامل الارتباط بيرسون (Pearson correlation) ، وذلك لتحليل العلاقة بين المتغير المستقل (التغير) والمتغير التابع (الإشعاع الشمسي) ، ولبيان قوة تأثير التغير في قيم الإشعاع الشمسي تم اختبار الدلالة الإحصائية تحت مستوى معنوي (1%) .
توصل البحث إلى أن هنالك ارتباطاً عكسياً بين التغير والإشعاع الشمسي في محطات منطقة الدراسة، وان أعلى قيمة ارتباط سجلت في محطة كركوك (- 0,84) بينما سجلت محطة الرطبة أوطأ ارتباط بلغت (- 0,43)، وان جميع علاقات الارتباط كانت ذات دلالة إحصائية معنوية عند مستوى (1%) . وان التغير يفسر ما قيمته (19,1 ؛ 53,4 ؛ 54,9 ؛ 62,1 ؛ 71,3) % من التباين الحاصل في قيم الإشعاع الشمسي على التوالي في محطات الرطبة والناصرية وبغداد والموصل وكركوك.

إضافة لما تقدم تبين ان قيم β بلغت (-59,47 ؛ -80,52 ؛ -87,71 ؛ -96,36 ؛ -102,8) على التوالي في محطات الرطبة والموصل و بغداد و الناصرية وكركوك. و ان أعلى تأثير للتغير في الإشعاع الشمسي قد سجل في محطة كركوك ، تلتها محطات الموصل وبغداد ثم الناصرية ، فيما كان أدنى تأثير قد سجل في محطة الرطبة ، وهذا يعني ان اي تغييرا في قيمة التغير يقود الى تغيير في قيم الإشعاع الشمسي في منطقة الدراسة.

وهذا يشير إلى أن أي زيادة في نسبة التغير ينعكس اثره في انخفاض قيم الإشعاع الشمسي الواصل لمحطات منطقة الدراسة.
المقدمة:-

ان ديناميكية الغلاف الجوي و حدوث آلاف الاضطرابات الجوية عند كل لحظة ، والتي تتباين في حجمها من الزوايا الترابية الصغيرة إلى المنخفضات الجوية الكبيرة ، وهي تستمد طاقتها من الإشعاع الشمسي. فهي ترتبط معاً بعلاقات متبادلة تتفاوت في قوتها من عملية لأخرى وتشكل جميعها شبكة من العلاقات المتبادلة. فان ماهدف إليه البحث، هو إيضاح علاقة التغير في قيم الإشعاع الشمسي من خلال الكشف عن سلوك الإشعاع الشمسي بفعل قيم التغير في منطقة الدراسة، ولذلك يمكن صياغة مشكلة البحث بما يلي:-

(هل يوجد للتغير علاقة بقيم الإشعاع الشمسي في العراق؟).

ولغرض الإجابة على سؤال مشكلة البحث فإن فرضية البحث تتلخص بما يلي:

(للتغير علاقة بقيم الإشعاع الشمسي في العراق).

اعتمد البحث على بيانات (5) محطات انوائية موزعة على منطقة الدراسة (لاحظ جدول (1) والشكل (1))، وهي محطات (الموصل، كركوك، بغداد، الرطبة، الناصرية) وخلال مدة (38) سنة، وذلك لتوفر بيانات الإشعاع الشمسي للمدة (1970-2007) . وللوصول إلى اختبار الفرضية وإثباتها من عدمه، تم الاستعانة ببرنامج الحزم الإحصائية (SPSS) الإصدار (15).

جدول (1)

المحطات المناخية في منطقة الدراسة

المحطة	خط الطول	دائرة العرض	الارتفاع/م
محطة الموصل	43° 09'	36° 19'	223
محطة كركوك	44° 24'	35° 28'	331
محطة بغداد	44° 24'	33° 18'	34
محطة الرطبة	40° 17'	33° 02'	615
محطة الناصرية	46° 14'	31° 01'	3

المصدر:


- 1- جمهورية العراق ، وزارة النقل ، الهيئة العامة للأقواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسم المناخ ، بيانات (1970-2007)م.
- 2- جمهورية العراق ، وزارة النقل والمواصلات ، الهيئة العامة للأقواء الجوية والرصد الزلزالي ، أطلس مناخ العراق ، بغداد ، 1979.

دراسة خصائص التغير والإشعاع الشمسي في منطقة الدراسة:

1- خصائص التغير:

الغيوم ظاهرة مائية تتجمع من قطرات الماء او ثلج او كليهما، تكون معلقة بالهواء، تتكثف مع بعضها مكونة بشكل يمكن رؤيته⁽¹⁾، وتكون مرئية بفعل ضوء الشمس الذي تعكسه أو تسطيره أو تجمعها جسيماتها.

¹ قصي عبد المجيد السامرائي، مبادئ الطقس والمناخ، عمان، دار اليازوري، 2008، ص223.



شكل (1)

توزيع المحطات المناخية المختارة في منطقة الدراسة

المصدر:

- 1- جمهورية العراق ، وزارة الري ، الهيئة العامة للمساحة ، بغداد ، 1992.
- 2- جمهورية العراق ، وزارة النقل والمواصلات ، الهيئة العامة لأنواع الجوية والرصد الزلزالي ، اطلس مناخ العراق ، بغداد ، 1979.

تحتوي الغيوم على نسب متفاوتة من الماء قد يتراوح قطرها بين (5-100) ميكرون ويتركز (10-100)قطرة /سم، ويبلغ معدل كمية الماء في الغيوم (1)غم/م³ ولكن قد يقل عن ذلك في الغيوم الباردة او القليلة السُمك ويبلغ (0,3)غم/م³، بينما يتجاوز في الغيوم الدافئة (10-50) غم/م³(2) يظهر الجدول (2) تباين قيم التغميم في منطقة الدراسة، وان ظهور الغيوم يبدأ بشكل رئيس في شهر تشرين الأول في عموم منطقة الدراسة وتصل في محطة الموصل وبغداد والناصرية على التوالي (2,08 ، 2,04 ، 1,39) اوكتاس، وهذا بفعل قلة وعمق المنخفضات الجوية.ثم تأخذ قيم التغميم بالارتفاع ويسجل شهر كانون الأول أعلى قيم التغميم الشهري في جميع محطات منطقة الدراسة ، ويبلغ في محطة الموصل وبغداد والناصرية على التوالي (4,31، 3,48، 2,72) اوكتاس، وهذا بفعل الزيادة في نشاط المنخفضات الجوية ، وخصوصاً منخفضات البحر المتوسط والمنخفضات المندمجة. تستمر القيم للتغميم على نفس الوتيرة مع انخفاض قليل في شهر (اذار) وتصل خلال هذا الشهر في محطة الموصل وبغداد والناصرية على التوالي الى (3,73) ،(2,14، 3,32)اوكتاس، وذلك لاستمرار تأثير نشاط المنخفضات الجوية ، ثم تبدأ قيم التغميم بالانخفاض من شهر (مايس) حتى شهر

² عامر حسن محمد علي البياتي، تأثير العوامل الجوية على الاشعاع الشمسي لمدينة بغداد ، رسالة ماجستير، قسم هندسة المكنان والمعدات، الجامعة التكنولوجية، 1983، ص9.

(ايلول) ويسجل شهر (اب) اقل قيم التغير في منطقة الدراسة، ويبلغ في محطات الموصل وبغداد والناصرية على التوالي (0,22، 0,23، 0,24) اوكتاس، وذلك لتأثير منخفض الهند الموسمي والمنخفض السوداني اللذان يسببان في انخفاض قيم التغير⁽³⁾.

جدول(2)

المعدل الشهري للتغير (اوكتاس) في محطات منطقة الدراسة للمدة (1970-2007)م

المحطات	الموصل	كركوك	بغداد	الربطية	الناصرية
كانون/2	4.13	3.59	3.21	3.22	2.48
شباط	4.03	3.51	3.06	2.77	2.1
اذار	3.73	3.21	3.32	2.88	2.14
نيسان	3.62	3.29	3.41	3.04	2.48
مايس	2.75	2.19	2.45	2.26	1.85
حزيران	0.76	0.47	0.44	0.38	0.41
تموز	0.34	0.3	0.25	4.1	0.29
اب	0.22	0.16	0.23	0.24	0.24
ايلول	0.45	0.33	0.38	0.4	0.33
تشرين/1	2.08	1.89	2.04	2.11	1.39
تشرين/2	2.87	2.69	2.82	2.55	2.16
كانون/1	4.31	3.67	3.48	3.48	2.72

المصدر: جمهورية العراق، وزارة النقل، الهيئة العامة للأشياء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة.

2- خصائص الإشعاع الشمسي:

يعد الإشعاع الشمسي المصدر الاساس للطاقة في الغلاف الجوي ، حيث ان الموجات الكهرومغناطيسية للإشعاع الشمسي تقوم بنقل هذه الطاقة من الشمس الى سطح الارض، وتحدد شدة وكمية الإشعاع الشمسي بحركة اشعة الشمس الظاهرية نحو مدار السرطان شمالاً ومدار الجدي جنوباً، وتكون الزاوية العمودية او شبه العمودية عند خط الاستواء والمدارين، وتنتج عنه زيادة في كمية الإشعاع الشمسي المستلم، بسبب قصر المسافة التي يقطعها الإشعاع الشمسي، خاصتاً مع قلة بخار الماء والغيوم والأتربة العامة في الهواء، بينما يكون الشكل الاخر للإشعاع الشمسي هو المائل في حالة الابتعاد عن خط الاستواء والمدارين. (لاحظ جدول(3)). يظهر الجدول(4) تباين في قيم الإشعاع الشمسي المسجلة في منطقة الدراسة اذ تأخذ قيم الإشعاع الشمسي بعد 21 اذار بأرتفاع عما هي ما سجلت قبله وتبلغ خلال هذا الشهر في محطات الموصل وبغداد والناصرية على التوالي (461,23، 470,22 ، 368,51) ملي واط/سم² وهذا بفعل الزيادة في زاوية سقوط الإشعاع الشمسي.

تستمر قيم الإشعاع الشمسي بالارتفاع ويسجل اعلى قيمة في اشهر (حزيران، تموز، اب) وتبلغ في محطة الموصل على التوالي (635,69، 613,3، 559,04) ملي واط/سم²، بينما في محطة بغداد (707,55، 695,99، 645,49) ملي واط/سم²، في حين في محطة الناصرية (604,78، 616,36، 586,66) ملي واط/سم²، وذلك لتعامد الأشعة على مدار السرطان خلال شهر (حزيران) مما انعكس اثره في زيادة زاوية الإشعاع الشمسي وارتفاع في قيم الإشعاع الشمسي المسجلة في منطقة الدراسة. تأخذ بعد ذلك المعدلات الشهرية للإشعاع الشمسي بالتراجع خلال الاشهر (ايلول) حتى شهر (شباط)، ويلاحظ ان شهر ايلول يسجل معدلات شهرية لقيم الإشعاع الشمسي اعلى مما هي عليه في شهر اذار، وذلك سببه يعود الى ان الفترة الممتدة من (1-23/ايلول) تكون اشعة الشمس ما تزال في نصف الكرة الشمالي لذلك ترفع اقيام زوايا سقوط الإشعاع الشمسي في منطقة الدراسة، بينما في شهر (اذار) تكون اشعة الشمس حتى يوم (21 اذار) تسقط الى الجنوب من خط الاستواء، مما سبب هذا الفرق في كمية الإشعاع الشمسي بين شهري (اذار وايلول) ، وتبلغ قيم الإشعاع الشمسي خلال شهر ايلول في محطات (الموصل وبغداد والناصرية) على التوالي (489,05، 552,54، 534,86) ملي واط/سم² وتسجل اقل قيم للإشعاع الشمسي خلال شهر كانون الاول وتبلغ في محطات الموصل وبغداد والناصرية على التوالي (178,73، 256,28، 271,09) ملي واط/سم².

3- تحليل علاقة التغير بالإشعاع الشمسي في منطقة الدراسة:-

يظهر الجدول (5) النتائج الإحصائية لعلاقة الارتباط بين الإشعاع الشمسي و التغير وكذلك يبين دور التغير في الإشعاع الشمسي في محطات منطقة الدراسة، حيث أظهرت قيم معامل الارتباط بين الإشعاع الشمسي و التغير في محطات الدراسة أن هناك ارتباطاً عكسياً بين المتغيرين في جميع المحطات ، أعلى قيمة ارتباط كانت في محطة كركوك آذ بلغت (-0,84) بينما سجلت محطة الربطية أوطاً علاقة ارتباط (-0,43) ، وتقاربت قيم الارتباط في المحطات الأخرى آذ بلغت (-0,78 ؛ -0,74 ؛ -0,73) على التوالي في الموصل وبغداد والناصرية . وان جميع علاقات الارتباط كانت ذات دلالة إحصائية معنوية على مستوى 1% . وتبين الأشكال(2؛3؛4؛5؛6) علاقة الارتباط الخطية بين المتغيرين في محطات منطقة الدراسة.

جدول(3)

³ يوسف محمد علي الهذال، تكرار المنظومات الضغظية المختلفة واثرها في تباين قيم الإشعاع الشمسي وشفافية الهواء في العراق خلال السنوات(1980-1989)، رسالة ماجستير، كلية الاداب، جامعة بغداد، 1994، ص76.

المعدل الشهري لزاوية سقوط الإشعاع الشمسي (درجة) في منطقة الدراسة

الناصرية	الربطية	بغداد	كركوك	الموصل	
35.59	33.58	33.42	31.32	30.41	ك2
45.59	43.58	43.42	41.32	40.41	شباط
56.59	54.58	54.42	52.32	51.41	آذار
68.59	66.58	66.42	64.32	63.41	نيسان
77.59	75.58	75.42	73.32	72.41	مايس
81.59	79.58	79.42	77.32	76.41	حزيران
79.59	77.58	77.42	75.32	74.41	تموز
72.59	70.58	70.42	68.32	67.41	أب
62.59	60.58	60.42	58.32	57.41	أيلول
50.59	48.58	48.42	46.32	45.41	ت1
39.59	37.58	37.42	33.32	34.41	ت2
34.59	32.58	32.42	33.32	29.41	ك1

المصدر: الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على:-

1- علي حسين الثلث, الكرة الأرضية من الوسائل المساعدة في تدريس الجغرافية, البصرة مطبعة جامعة البصرة 1979, ص57-73.

جدول (4)

المعدل الشهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلي (ملي واط/سم²) في منطقة الدراسة للمدة (1970-2007)

المحطات					اشهر السنة
الناصرية	الربطية	بغداد	كركوك	الموصل	
294	256.56	285.51	215.16	197.01	كانون اول
385.75	344.11	371.05	282.64	280.51	شباط
461.23	454.26	470.22	370.64	368.51	آذار
545.11	560.03	560.94	469.79	460.57	نيسان
593.91	642.76	638.27	575.09	556.51	مايس
604.78	726.06	707.55	675.88	635.69	حزيران
616.36	720.21	695.99	656.67	613.3	تموز
586.66	651.49	645.49	610.37	559.04	أب
534.86	561.48	552.54	522.11	489.05	أيلول
431.65	433.92	430.69	378.86	344.01	تشرين اول
321.58	312.27	320.36	259.74	234.83	تشرين ثاني
271.09	248.77	256.28	193.42	178.73	كانون اول


المصدر: جمهورية العراق, وزارة النقل, الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخ, بيانات غير منشورة.


جدول (5)

معامل الارتباط بين التعميم (اوكتاس) والإشعاع الشمسي (ملي واط/سم²) في محطات منطقة الدراسة


المحطات	معامل الارتباط	معامل التحديد	قيمة المحسوبة	المعنوية	قيمة β
الموصل	-0.788	0.621	10.568	0.002	-80.529
كركوك	-0.845	0.713	12.551	0.001	-102.899
الربطية	-0.437	0.191	6.247	0.008	-59.472
بغداد	-0.741	0.549	10.932	0.002	-87.716
الناصرية	-0.731	0.534	12.059	0.001	-96.363

الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على الجدولين (4و2)






شكل (4)
خط الانحدار بين المعدلات الشهرية للتغيم (اوكتاس) والإشعاع الشمسي (ملي واط/سم²)
في محطة الرطبة
المصدر:- الشكل من عمل الباحث بالاعتماد على الجدولين (1, 3)



شكل (5)
خط الانحدار بين المعدلات الشهرية للتغيم (اوكتاس) والإشعاع الشمسي (ملي واط/سم²)
في محطة بغداد
المصدر:- الشكل من عمل الباحث بالاعتماد على الجدولين (1, 3)



شكل (6)

خط الانحدار بين المعدلات الشهرية للتغيم (اوكتاس) والإشعاع الشمسي (ملي واط/سم²) في محطة الناصرية

المصدر:- الشكل من عمل الباحث بالاعتماد على الجدولين (1, 3)

كذلك يلاحظ ان نتائج قيم معامل التحديد كانت (0,191؛ 0,534؛ 0,549؛ 0,621؛ 0,713) على التوالي في محطات الرطبة و الناصرية و بغداد والموصل وكركوك ، وهذا يعني ان التغيم يفسر ما قيمته (19,1 ؛ 53,4 ؛ 54,9 ؛ 62,1 ؛ 71,3 % من التباين الحاصل في الاشعاع الشمسي على التوالي في محطات الرطبة والناصرية وبغداد والموصل وكركوك. من جهة أخرى فقد كانت قيم β (-59,47 ؛ -80,52 ؛ -87,71 ؛ -96,36 ؛ -102,8) على التوالي في محطات الرطبة والموصل و بغداد و الناصرية وكركوك يتضح من النتائج في أعلاه ان أعلى تأثير للتغيم في الإشعاع الشمسي قد سجل في محطة كركوك ، تلتها محطات الموصل وبغداد ثم الناصرية ، فيما كان أدنى تأثير قد سجل في محطة الرطبة. وهذا يعني ان اي تغييرا في قيمة التغيم يقود الى تغيير في قيم الإشعاع الشمسي في منطقة الدراسة.

المصادر:-

- 1- ألبياتي، عامر حسن محمد علي ، تأثير العوامل الجوية على الإشعاع الشمسي لمدينة بغداد ، رسالة ماجستير ، قسم هندسة المكنان والمعدات، الجامعة التكنولوجية، 1983.
- 2- الشلش، علي حسين ، الكرة الأرضية من الوسائل المساعدة في تدريس الجغرافية ، البصرة مطبعة جامعة البصرة ، 1979.
- 3- السامرائي ، قصي عبد المجيد ، مبادئ الطقس والمناخ، عمان، دار البازوري، 2008،
- 4-الهذال، يوسف محمد علي ، تكرار المنظومات الضغطية المختلفة واثرها في تباين قيم الاشعاع الشمسي وشفافية الهواء في العراق خلال السنوات(1980-1989)، رسالة ماجستير، كلية الاداب، جامعة بغداد، 1994،
- 5- جمهورية العراق، وزارة النقل، الهيئة العامة لأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة.
- 6- جمهورية العراق ، وزارة النقل والمواصلات ، الهيئة العامة لأنواء الجوية والرصد الزلزالي ، اطلس مناخ العراق ، بغداد ، 1979.
7. جمهورية العراق ، وزارة الري ، الهيئة العامة للمساحة ، بغداد ، 199